

飼主さま向け

zoetis®

動物用医薬品 要指示 指定

レボリューション® プラス

セラメクチン/サロラネル

レボリューション® プラスで

守りは盤石



猫用

寄生虫薬



ノミ成虫



ノミ卵



ノミ幼虫



マダニ



ミミヒゼンダニ



鉤虫



回虫



フィラリア



猫医療分野で世界的に信頼のある学会ISFMより、「幅広い効能と猫に与えやすい剤型を併せ持った、飼主にとって大変有益な製品」として、

Easy-to-Give Award 2018 を受賞しました。

レボリューション® プラスの特長



2種類の有効成分※は皮膚に滴下後すみやかに体内に吸収され、皮膚や被毛にはほとんど残らないので、安心して抱っこなどスキンシップができます。

※ 有効成分：セラメクチン／サロラネル



錠剤を飲むのが苦手な猫の飼主さまでも扱いやすいスポットタイプです。



1剤で8つの効能。幅広く寄生虫を駆除・予防できます。
(詳しくは中面ページをご覧ください)



体重 1.3kg、8週齢の子猫からお使いになれます。

体重別製品ラインナップ



0.25mL 黄



0.5mL 橙



1.0mL 緑

体重 2.5kg 未満

体重 2.5kg 以上
5.0kg 未満

体重 5.0kg 以上
10.0kg 未満

※ 10Kg 以上：適切なピペットを組み合わせ使用

※ 1.3kg 以上からお使いになれます

ご使用に際しての注意事項



1回の投薬でピペット**全量**を滴下してください。



投与後、皮膚・被毛が乾くまで**水に濡らしたり投与部位を直接触る事のないよう**にご注意ください。



飲み薬ではありません。
万が一、飲ませてしまった場合はすぐにかかりつけの獣医師に申し出てください。



ブリスターシート開封前であれば**室温**で保存できます。



使用期限は**箱の裏面**や**ブリスターシート**に記載されていますのでご確認ください。



フィラリア

蚊に吸血された際に
フィラリア幼虫が体内に感染します。
慢性的な咳や嘔吐、発熱、食欲減退などの症状
を示し、診断や治療が難しく、猫の突然死の
原因の一つとされています。
全国的に発症例が確認されています。

10頭に1頭の割合で
フィラリア幼虫が感染※

※ 出典：佐伯 英治 (Clinic Note 55:34, 2010, Interzoo)

ミミヒゼンダニ

猫の外耳炎の主要な原因のひとつ。
耳を激しくかゆがり、悪臭や黒い耳垢が多く
見られます。

1歳未満猫の疾患ランキングで
耳の疾患は第4位 (アニコム家庭どうぶつ白書2017より)

マダニ

広い公園や河川敷・山などの
草むらに潜み、皮膚に取りついて
長時間吸血します。
吸血の際に様々な病原体 (SFTSウイルスなど)
が感染することがあります。

外出する猫ちゃんは
特に注意が必要です。



猫の平均寿命は約15歳※。
健康で長生きして欲しいから
総合的な寄生虫対策をおすすめします。

※ ペットフード協会2018年調査結果より抜粋



レボリューション® プラスでできる、さまざまな寄生虫対策



フィラリア

月1回の定期投与で寄生予防を確認



ノミ成虫

投与・再寄生後12時間以内に殺効果発現、
24時間後に感染ノミ全数を駆除
これら駆除効果は投与後35日目まで維持



ミミヒゼンダニ

1回の投薬で30日目に
99.2%の駆除効果を確認



猫回虫・猫鉤虫

1回の投薬で感染虫体全数を駆除




マダニ

投薬後24時間・再寄生後12時間で
駆除効果発現。35日間効果持続



ノミ卵・ノミ幼虫

産卵をほぼ全頭で抑制。卵の孵化阻害・
殺幼虫効果で環境中のノミ対策も万全




ノミ (成虫・幼虫・卵)

猫だけでなく犬や人にも
寄生して吸血による皮膚炎を
引き起こすことがあります。
繁殖力が強く気温13℃以上であれば冬でも活
動できるので通年の対策が推奨されています。

ペットに寄生する成虫は
わずか5%。
残り95%は環境中に
潜んでいます。



5% 成虫



猫回虫・猫鉤虫

土壌中の虫卵の摂取や
母乳などからの感染によって
小腸内に寄生します。

お子様を含めて飼主さまへも
虫卵の摂取によって
感染するリスクがあります。

※ 人への感染は主に猫回虫の場合



ピペットの開け方・投与方法

ピペットの開け方

- ① ピペットをプリスターから取り出します。



- ② ピペットを上向きに持ち、キャップを垂直にしっかりと押し込んで、ピペットの先端に穴を開けます。



- ③ キャップを取り外し、ピペットの先端に穴が開いていることを確認します。



もう片方の手でピペットを固定すると、キャップを垂直に押し込みやすくなります。



開かない場合は、両手でキャップを垂直にしっかりと押し込みます。


チャイルドレジスタンス (CR) 機能

お子様が開封しにくい、チャイルドレジスタンス機能を有するピペットです。

投与方法



ピペットの先を皮膚にあてたまま3～4回しぼります。



ピペットを皮膚から引き離して、中が空になっていることを確認します。

投与日記入欄 (月／日)

/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

ねこを守ろう。WEB サイト
<https://nekomamo.com>

